

Skadelidtes vaccinationsstatus og antistof respons	Vaccinationsstrategi	Kontrol
Ikke tidligere vaccineret	Vaccination dag 0 og efter 1,2 og 12 mdr. Ønskes hurtig immunisering kan vaccination gives dag 0,7 og 21 samt efter 12 mdr.	Kontrol af anti-HBs 1-2 mdr. efter endt vaccination hos personer med fortsat risiko for eksposition
Tidligere fuldt hepatitis B vaccineret med ukendt HBs-antistof respons	Vaccination dag 0	Hvis anti-HBs dag 0 er ≥ 10 IU/l vaccineres ikke yderligere. I modsat fald kontrolleres anti-HBs efter 1 mdr. Er den herefter ≥ 10 IU/l vaccineres ikke yderligere i modsat fald konfereres med specialafdeling
Personer med normalt immunforsvar, der er vaccineret fuldt og har kendt anti-HBs ≥ 10 IU/l 1-2 mdr. efter endt vaccinationsserie	Der er ikke indikation for vaccination	
Personer der er i gang med en vaccinationsserie	Vaccinationsserien fuldføres som planlagt	Kontrol af anti-HBs 1-2 mdr. efter endt vaccination hos personer med fortsat risiko for eksposition
Tegn på aktuell eller tidligere smitte med hepatitis B	Ikke behov for vaccination	Hvis HBsAg er positiv henvises til infektionsmedicinsk specialafdeling